

【レジメン概要】

適応病名 (癌腫)	結腸・直腸癌		レジメン名 (略号)	FOLFIRI(インヒュ)	
実施部署区分	<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 治験/臨床試験		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> その他	
適応ライン	<input checked="" type="checkbox"/> 1次	<input type="checkbox"/> 2次	<input type="checkbox"/> 3次		
インターバル/ 使用コース数(標準)	投与日(d1,d8など)		d1		
	休薬日数	14日間		1コース	
内服併用	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			
放射線療法	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			

【抗がん剤 投与内容】

Rp	薬剤	催吐 リスク	投与ルート	投与量	投与時間・ 投与速度	投与日
1	イリノテカン	中等度	中心静脈	150mg/m ²	120分	d1
2	レボホリナート		中心静脈	200mg/m ²	120分	d1
3	5FU bolus	軽度	中心静脈	400mg/m ²	15分	d1
4	5FU	軽度	中心静脈	2400mg/m ²	46時間	d1-3
5						

減量中止基準 (具体的に記載.)	白血球数	<3000	/mm ²	sCr	mg/dL
	好中球数		/mm ²	CCr	mL/min
	Hb		mg/dL	T-Bil	mg/dL
	PLT	<10万	/mm ²	AST	IU/L
				ALT	IU/L
	その他	イリノテカンは高度な下痢や嘔吐に伴いショック(循環不全)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下等が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。			
エビデンス資料 ★必須★	<input type="checkbox"/> ガイドライン	ガイドライン名			
	<input type="checkbox"/> 文献	文献名			
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	提出書類名	イリノテカン添付文書、エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック2012 p.226		
備考欄 【副作用対策、指示など】	<p>・イリノテカンはB法の用量、投与時間は90分以上。</p> <p>・UGT1A1遺伝子多型の確認が必要(ホモ接合型・ヘテロ接合型は慎重投与。初回より減量も考慮。)</p>				