

【レジメン概要】

適応病名 (癌腫)	結腸・直腸癌		レジメン名 (略号)	XELOX	
実施部署区分	<input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 治験/臨床試験		
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> その他	
適応ライン	<input checked="" type="checkbox"/> 1次	<input type="checkbox"/> 2次	<input type="checkbox"/> 3次		
インターバル/ 使用コース数(標準)	投与日(d1,d8など)		d1		
	休薬日数	21日間		1コース	
内服併用	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし			
放射線療法	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし			

【抗がん剤 投与内容】

Rp	薬剤	催吐 リスク	投与ルート	投与量	投与時間・ 投与速度	投与日
1	エルプラット	中等度	末梢点滴静注	130mg/m ²	120分	d1
2	カペシタビン	軽度	経口	C法	2回/日	d1夕-d15朝
3						
4						
5						

減量中止基準 (具体的に記載.)	白血球数	<2000(grade3)	/mm ²	sCr	mg/dL	
	好中球数	<1000(grade3)	/mm ²	CCr	mL/min	
	Hb		mg/dL	T-Bil	mg/dL	
	PLT	<5万(grade3)	/mm ²	AST	IU/L	
				ALT	IU/L	
	その他	grade2以上の非血液毒性(末梢神経症状を除く)を認めた場合、減量・中止。 grade2以上の末梢神経症状を認めた場合減量。投与中～投与2時間後に急性の咽頭喉頭感覚異常の発現は、エルプラットの点滴時間を2時間→6時間へ延長。 血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準				
		Grade	発現回数	Cape	L-OHP	
		G3	1	1段階減量	100mg/m ²	
			2	2段階減量	85mg/m ²	
		G4	1	中止もしくは2段階減量	中止もしくは85mg/m ²	
	非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準					
	Grade	発現回数	Cape	L-OHP		
		1	変更なし	変更なし		
	G2	2	1段階減量	変更なし		
		3	2段階減量	変更なし		
	G3	1	1段階減量	100mg/m ²		
		2	2段階減量	85mg/m ²		
	G4	1	中止もしくは2段階減量	中止もしくは85mg/m ²		

エビデンス資料 ★必須★	<input type="checkbox"/> ガイドライン	ガイドライン名																																					
	<input type="checkbox"/> 文献	文献名																																					
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	提出書類名	ヤクルト「XELOX法投与開始・減量基準」提供、エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック2012 p.222																																				
備考欄 【副作用対策、指示など）	<p>●Cape ・Hand-Foot-Syndrome(HFS)・・・セット処方あり G2→休薬 保湿クリーム、ステロイド外用剤で対処 ビタミンB6製剤の内服</p> <p>●L-OHPによる血管痛 ・温罨法 ・点滴速度を遅くする カペシタビン:2000mg/m²/日 1日2回内服 (d1-14),1週間休薬 (1日目にカペシタビンを投与することが難しい場合は、主治医の判断で2日目の朝食後から投与することも可)</p> <p><ゼローダの減量時1回投与量></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">体表面積</th> <th colspan="3">1回投与量</th> </tr> <tr> <th>初回投与量</th> <th>減量段階1</th> <th>減量段階2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.36 m²未満</td> <td>1,200 mg (4錠)</td> <td rowspan="2">900 mg (3錠)</td> <td rowspan="2">600 mg (2錠)</td> </tr> <tr> <td>1.36 m²以上1.41 m²未満</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> </tr> <tr> <td>1.41 m²以上1.51 m²未満</td> <td rowspan="2">1,800 mg (6錠)</td> <td rowspan="2">1,200 mg (4錠)</td> <td rowspan="2">900 mg (3錠)</td> </tr> <tr> <td>1.51 m²以上1.66 m²未満</td> <td rowspan="2">2,100 mg (7錠)</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> </tr> <tr> <td>1.66 m²以上1.81 m²未満</td> <td rowspan="2">2,100 mg (7錠)</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> <td rowspan="2">1,200 mg (4錠)</td> </tr> <tr> <td>1.81 m²以上1.96 m²未満</td> <td rowspan="2">2,100 mg (7錠)</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> <td rowspan="2">1,200 mg (4錠)</td> </tr> <tr> <td>1.96 m²以上2.11 m²未満</td> <td rowspan="2">2,100 mg (7錠)</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> <td rowspan="2">1,200 mg (4錠)</td> </tr> <tr> <td>2.11 m²以上</td> <td rowspan="2">2,100 mg (7錠)</td> <td rowspan="2">1,500 mg (5錠)</td> <td rowspan="2">1,200 mg (4錠)</td> </tr> </tbody> </table>			体表面積	1回投与量			初回投与量	減量段階1	減量段階2	1.36 m ² 未満	1,200 mg (4錠)	900 mg (3錠)	600 mg (2錠)	1.36 m ² 以上1.41 m ² 未満	1,500 mg (5錠)	1.41 m ² 以上1.51 m ² 未満	1,800 mg (6錠)	1,200 mg (4錠)	900 mg (3錠)	1.51 m ² 以上1.66 m ² 未満	2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1.66 m ² 以上1.81 m ² 未満	2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)	1.81 m ² 以上1.96 m ² 未満	2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)	1.96 m ² 以上2.11 m ² 未満	2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)	2.11 m ² 以上	2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)
体表面積	1回投与量																																						
	初回投与量	減量段階1	減量段階2																																				
1.36 m ² 未満	1,200 mg (4錠)	900 mg (3錠)	600 mg (2錠)																																				
1.36 m ² 以上1.41 m ² 未満	1,500 mg (5錠)																																						
1.41 m ² 以上1.51 m ² 未満		1,800 mg (6錠)	1,200 mg (4錠)	900 mg (3錠)																																			
1.51 m ² 以上1.66 m ² 未満	2,100 mg (7錠)				1,500 mg (5錠)																																		
1.66 m ² 以上1.81 m ² 未満		2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)																																			
1.81 m ² 以上1.96 m ² 未満	2,100 mg (7錠)				1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)																																	
1.96 m ² 以上2.11 m ² 未満		2,100 mg (7錠)	1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)																																			
2.11 m ² 以上	2,100 mg (7錠)				1,500 mg (5錠)	1,200 mg (4錠)																																	